

# Ce que vous devez savoir sur le cancer du col de l'utérus



## Le Programme National de Lutte contre le Cancer

vous aide et vous  
informe par une collection  
de brochures gratuites  
sur les cancers.

### Où s'adresser ?


- Centre hospitalier de Libreville :  
service d'oncologie médicale,  
service gynécologie
- Fondation Jeanne Ebori :  
service de gynécologie
- Hôpital d'Instruction des Armées  
Omar Bongo Ondimba :  
service de gynécologie



Cette brochure est éditée avec le concours de la Fondation Albertine Amissa BONGO


## Le cancer du col de l'utérus

Le col de l'utérus est une partie de l'appareil génital de la femme. Les schémas ci-contre précisent sa localisation.



A. Appareil génital féminin. Vue de face.

Les cellules de cette zone sont souvent à l'origine de transformations qui peuvent évoluer vers le cancer.



B. Appareil génital féminin. Vue de profil.

### Les signes d'alerte

Il faut distinguer deux situations différentes :

1. Le cancer découvert en l'absence de signe d'alerte. C'est celui qui est dépisté par un examen gynécologique systématique.

2. Le cancer révélé par des signes cliniques qui peuvent être :

- Des pertes anormales ;
- Des saignements de faible quantité après les règles ou après la ménopause. Ces saignements peuvent être provoqués par un traumatisme léger tels que les rapports sexuels, un voyage, une toilette intime. Quelquefois les saignements sont remplacés par de petites pertes rosées ou brunâtres.

Tous ces signes doivent alerter la femme et l'amener à consulter un spécialiste.

### Les facteurs favorisants

Les facteurs de risques reconnus sont :

1. Les infections génitales par le papilloma virus. Des premiers rapports sexuels à un âge précoce et plus encore la multiplicité des partenaires sexuels favorisent la contamination par ce virus. L'infection virale provoque

fréquemment chez les femmes des lésions bénignes : les condylomes, mais favorisent aussi l'apparition des lésions dysplasiques susceptibles de devenir cancéreuses ;

2. Le tabagisme ;

3. Le VIH responsable du SIDA.

### Les moyens de préventions

Il est important de savoir que tout cancer diagnostiqué à un stade précoce répond mieux au traitement. Certains cancers peuvent être asymptomatiques pendant longtemps, c'est à dire n'émettent des signes d'alerte que tardivement au moment où le cancer est à un stade avancé d'où l'intérêt du dépistage.

### Le dépistage

Le dépistage permet de repérer les cancers asymptomatiques encore appelés états pré-cancéreux. Le frottis cervico-vaginal est l'examen le plus

